

ବିଦେଶୀ ଗତ ପତ୍ର ପରିବାର

ସଂପାଦନା



ଡଃ. କୁନ୍ଦୁ କୁମାର ପତି
ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ

ବିଷୟବସ୍ତୁ



ଶ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଳା କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସମରେନ୍ଦ୍ର ବରାଳ, ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁଭା କୁକୁର୍

କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟତା: ଶ୍ରୀ ସୋମବତ୍ତ ମହାନ୍ତି

କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଉରକେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼-୨
ହକିକ୍ତକ, ପାନପୋଷ, ରାଉରକେଲା- ୭୬୯୦୦୪, ଫୋନ: ୦୬୬୧-୨୯୧୦୨୩୪

E-mail: kvksundargarh2.ouat@gmail.com, www.kvksundargarh2.org

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର



ବ୍ରୋକୋଲି

ବ୍ରୋକୋଲି ଏକ ଫୁଲକୋବି ଜାତୀୟ ଫସଲ । ଏହା ପରିବା ଓ ସାଲାଡ଼ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହାର ଫୁଲକୋବି ସବୁଜ ବା ବାଇଗଣି ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରୁ ଭିଟାମିନ୍ ‘କ’, ‘ଖ’ ଓ ‘ଗ’ ପ୍ରଭୃତି ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ । ବ୍ରୋକୋଲି କ୍ୟାନସର, ମଧୁମେହ ଓ ହୃଦ୍ ରୋଗ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଜଳବାୟୁ:

ବ୍ରୋକୋଲି ଏକ ଶୀତ ଦିନିଆ ଫସଲ । ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ଏବଂ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏହି ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ । ଏହାର ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 9° ରୁ 18° ସେଲ୍‌ସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ । ଫୁଲକଟ ଆସିବା ସମୟରେ 18° ରୁ 20° ସେଲ୍‌ସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବା ଦରକାର । ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ ଏହାର ଫୁଲକଟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ।

ମୃତ୍ତିକା:

ଉର୍ବର, ଦୋରସା, ନିଗିଡ଼ା ମାଟିରେ ବ୍ରୋକୋଲି ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ । ମାଟିର ଅମ୍ଳତା ୫.୫ ରୁ ୭.୫ରେ ଭଲ ହୁଏ ।

କିଷମ:

ଉନ୍ନତ କିଷମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଲାମ ସମୃଦ୍ଧି - ପ୍ରତି ଫୁଲ କଫ୍‌ର ଓଜନ ୩୦୦ ରୁ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପୁଷ୍ପା କେ.ଟି.ଏସ୍. ୧ - ପ୍ରତି ଫୁଲ କଫ୍‌ର ଓଜନ ୩୫୦ ରୁ ୪୫୦ ଗ୍ରାମ ।

ବିହନ ପରିମାଣ:

ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ମଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।

ଲଗାଇବା ସମୟ:

ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ନଭେମ୍ବର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ।

ପଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ତଳି ଘେରାରେ ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡକରି ୩ ମିଟର ଲମ୍ବ ୧ ମିଟର ଓସାର ଓ ୧୫ ରୁ ୨୦ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ପଟିରେ ୩୦ କେଜି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଓ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ୭ ଦିନ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ । ତଳି ପଟିକୁ ବିଶୋଧନ କରି ୫ ରୁ ୭ ସେ.ମି. ଦୂରତାରେ ଗାରଟାଣି ଅଧ ସେ.ମି.ରୁ ୧ ସେ.ମି. ଗଭୀରରେ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ଗୁଣ୍ଡ ମାଟି ଦେଇ ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ୪-୫ ଦିନ ବେଳକୁ ଗଜା ବାହାରି ଆସିଲେ ନଡ଼ାକୁ ପଟାଳି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ:

ଜମିକୁ ୩/୪ ଓଡ଼ ଚାଷ କରି ସମତଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ସମୟରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୪୫ ସେ.ମି. ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ଦୂରତା ୩୦-୪୫ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଖତ ଓ ସାର:

ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦-୧୫ ଟନ୍ ଭଲ ସଡ଼ା ଗୋବର ଖତ, ୧୦ କି.ଗ୍ରା. କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମୂଳସାର ହିସାବରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ୍ ଏବଂ ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଅଣୁସାର ହିସାବରେ ବୋରନ୍ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଏକର ପ୍ରତି ୮ କି.ଗ୍ରା. ବୋରାକ୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମୂଳସାର ହିସାବରେ ବୋରାକ୍ସ ନ ଦେଇଥିଲେ ୦.୨% ବୋରନ୍ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଜଳସେଚନ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ:

ତଳି ଲଗାଯିବାର ୨୦-୨୫ ଦିନ ପରେ ଥରେ କେଡ଼ାଖୋସା କରନ୍ତୁ । ଏହାର ୧୫ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କୋଡ଼ାଖୋସା କରି ହୁଡ଼ା ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ । ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲାପରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ଜମିର ଆର୍ଦ୍ରତା ଦେଖି ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

ରୋଗ ଓ ପୋକ:

ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରୋକୋଲି ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ପୋକ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଉପୋକ ଲାଗୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଜଉପୋକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ପରି କୋବି ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ଶୋଷକ ଜାତୀୟ କୀଟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ର ତଳପଟେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଗି ଏଥିରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଆନ୍ତି । ଫଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ରୁଗଣ ହୋଇଯାଏ ଓ ଏହାର ସ୍ୱାଦାବିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏମାନଙ୍କୁ ଦେହରୁ ନିସ୍ତୁତ ମଧୁ ପତ୍ରରେ ପଡ଼ି ତା ଉପରେ କଳା ଫିମି ମାଡିଯାଏ । ଫଳତଃ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ କୋବି ଗୁଡ଼ିକର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି. ମେଟାସିଫ୍ସ୍ କ୍ୱିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଅମଳ:

ଏକର ପ୍ରତି ହାରାହାରି ୫୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ।



ସିମଳା ଲଙ୍କା

ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଥମେ ସିମଳା ଲଙ୍କା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ ହେଲାଣି । ଏହାକୁ ଚରକାରୀ, ଆଚାର ଓ ସାଲାଡ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ହୋଟେଲ୍‌ମାନଙ୍କରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି । ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଜାରକୁ ପଠାଇଲେ ଏହା ଲାଭ ଜନକ ଚାଷ ହିସାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଜଳବାୟୁ:

ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଏ । ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଧାରଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଖରା ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତାପ ୨୬-୨୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍‌ସିୟସ୍ ରହିଲେ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହୋଇ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ।

ମୃତ୍ତିକା:

ଗଭୀର, ନିଗିଡ଼ା, ଉର୍ବର, ଦୋରସା ଏବଂ ଅମ୍ଳତା ୫.୫-୬.୮ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଚାଷ ଲାଭଜନକ ଭାବେ କରାଯାଇଥାଏ । ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଏବଂ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବା ମାଟିରେ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇ ନଥାଏ । ସର୍ବଦା ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।

କିଷମ:


ଉନ୍ନତ କିଷମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆକାଁ ଗୌରବ, ଆକାଁ ବସନ୍ତ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଖୁଣ୍ଟର, ଯୋଲୋ-ଖୁଣ୍ଟର ଏବଂ ପୁଷାଦାପ୍ତି । ଶଙ୍କର କିଷମ - ନୂତନ ହରିତ, ଅଳଙ୍କାର, ଭାରତ, ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିକାଶ ।

ବିହନ:

ଏଲର ପ୍ରତି ୧୦୦-୧୨୦ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ପ୍ରତି ୧ କି.ଗ୍ରା ମଞ୍ଜିକୁ ୩ ଗ୍ରାମ ଭିଟାଭାକୁ କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ ବାଭିଷିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ମଞ୍ଜିକୁ ଫରମାଲ୍‌ଡିହାଇଡ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଶୋଧିତ ତଳି ଘରାରେ ୭ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ଗାରଟାଣି ୧ ସେ.ମି. ଗଭୀରରେ ମଞ୍ଜି ପୋତନ୍ତୁ । ମାଟିକୁ ସମତୁଲ କରି ନଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ବାଭିଷିନ୍ (୨ ଗ୍ରାମ/ଲିଟର) ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ୭-୮ ଦିନରେ ଗଜା ହେବା ପରେ ନଡ଼ାକୁ



ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲଗାଇବାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଜଳସେଚନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଚାରାକୁ ମଜବୁତ୍ କରନ୍ତୁ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଚାରା ରୋପଣ:



ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଠ କରି ଉନ୍ନତ କିସମ ବିଶୋଧିତ ଚାରାକୁ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୪୫-୫୦ ସେ.ମି ଓ ଗଛକୁ ଗଛ ୩୦ ସେ.ମି. ଏବଂ ଶଙ୍କର କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୮୦-୯୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ୪୦ ଦିନର ଚାରା ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଲଗାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଯାଏ ମାଟିରେ ପୋତି ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ଏକର ପ୍ରତି ୭-୧୦ ଟନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଶେଷ ଓଡ଼ି

ଚାଷ ସମୟରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଟାଣି ତଳ ଭାଗରେ ମୂଳ ସାରକୁ ଦେଇ ମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ଜଳସେଚନ କରିବା ପରେ ଚାରା ଲଗାଇଲେ ସାରର ଅଧିକ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ।

ଖତସାର: ଏକର ପ୍ରତି ସାର (କି.ଗ୍ରାରେ) ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ।

ସାର	ଲଗାଇବା	୨୦-୨୫	୩୫-୪୦	୫୦-୬୦
ଉପାଦାନ	ସମୟରେ	ଦିନରେ	ଦିନରେ	ଦିନରେ
ଯବକ୍ଷାରଜାନ	୧୦-୨୦	୧୨-୨୦	୧୨-୨୦	୧୨-୨୦
ଫସ୍ଫରସ୍	୧୫-୩୦	୧୫-୩୦		
ପଟାସିୟମ୍	୮-୩୦	୮-୩୦	୮-୩୦	

ଜିଙ୍କର ଅଭାବରେ ପତ୍ର ଛୋଟ ଓ ମୋଡ଼ି ହୁଏ ଏବଂ ଫୁଲ ଢେରିରେ ଆସେ। ଏଥିପାଇଁ ମୂଳସାର ସହିତ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କି.ଗ୍ରା ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜିଙ୍କ୍ ଇଡ୍ରିଟିଏ (୨୫୦ ଗ୍ରାମ/ଏକର) ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

ପରବର୍ତ୍ତି ଯତ୍ନ:

ଚାରା ଲଗାଇବାର ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲିଥିବା ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ସାର ଦେବା ସମୟରେ କୋଡ଼ାଖୁଆ କରି ଅନାବନା ଗଛ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଛ ମୂଳକୁ ମାଟି ଟେକି ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ଗଣ୍ଡିରୁ ଶାଖା ବାହାରିଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶଙ୍କର କିସମ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଡ଼ି ପୋତି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ।

ପାଗ ଓ ମାଟିର ବତର ଦେଖି ୭-୧୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା:

ଫୁଲ ନାଶି ପତା ରୋଗ- କଞ୍ଚା ଫଳରେ ଡେମ୍ଫ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପାଣିଦାଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପରେ ଏହା ମୋଟା ହୋଇ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫଳ ଶୀଘ୍ର ପାଟିଯାଏ ।

ପ୍ରତିକାର:

ଜଳସେଚନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କୋଡାଣ୍ଡୁସା ସମୟରେ ଅଧିକ ଚେର ଛିଣ୍ଡିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅଧିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପାଇଁ ସି.ଏ.ଏନ୍. ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ କାଲସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ (୨ ଗ୍ରାମ/ଲିଟର) ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଅମଳ:

ଗାଡ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳା ଯାଇଥାଏ । ତାରା ଲଗାଇବାର ୪୫-୬୦ ଦିନରେ ପ୍ରଥମେ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ସପ୍ତାହ ଅନ୍ତରେ ଫଳ ତୋଳାଯାଇଥାଏ । ଫଳ ତୋଳିବା ସମୟରେ ଦିନେ ଦୁଇଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଳସେଚନ କରି ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଅମଳ କରାଯାଏ । ତାଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏଲର ପ୍ରତି ୧୦୦ ରୁ ୨୦୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଫଳ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ।



ଲେଟ୍ୟୁସ୍

ଲେଟ୍ୟୁସ୍ ଏକ ଅଣ୍ଡାଦିନିଆ ସାଲାଡ୍ ଫସଲ । ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍- ‘କ’, ‘ଗ’, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖଣିଜ ଲବଣ ଥାଏ ।

ଜଳବାୟୁ: ଲେଟ୍ୟୁସ୍ ଏକ ଅଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଫସଲ । ଏହା ଉପ ଉଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ଅଧିକ ଓ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଲେଟ୍ୟୁସ୍ ମଞ୍ଜି ଅଙ୍କୁରତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ୧୩° ରୁ ୧୬° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଉତ୍ତାପରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।

ମୃତ୍ତିକା: ଉର୍ବର, ନିଗିଡ଼ା, ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ଲେଟ୍ୟୁସ୍ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ମାଟିର ଅମ୍ଳତା ୬.୦ ରୁ ୬.୫ ରେ ଲେଟ୍ୟୁସ୍ ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।

ଉନ୍ନତ କିଷା: ଉନ୍ନତ କିଷା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା- ଗ୍ରେଟ୍‌ଲେକ୍ସ (କ୍ରିସପ ହେଡ୍ ପ୍ରକାର) ଚାଇନିଜ୍ ଯଲୋ

(ପତୁରିଆ), ଏବଂ ସ୍ଲୋ ବୋଲର୍ (ପତୁରିଆ)

ବିହନ : ଏଲର ପ୍ରତି ୧୬୦ ରୁ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଲଗାଇବା ସମୟ : ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ନଭେମ୍ବର ଲେଟୁୟସ୍ ଚାଷପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ।

ପଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି : ତଳି ଘରାରେ ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ୩ ମିଟର ଓସାର ଓ ୧୫ ରୁ ୨୦ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ପଟିରେ ୨ ଝୁଡ଼ି ଗୋବର ଖତ ଏବଂ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ । ତଳି ପଟିକୁ ବିଶୋଧନ କରି ୫ ରୁ ୭ ସେ.ମି. ରୁ ୧ ସେ.ମି. ଗଭୀରରେ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ଗୁଣ୍ଡ ମାଟିଦେଇ ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ପଟାଳିକୁ ନଡ଼ା ଦ୍ଵାରା ଘୋଡାଇ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝରା ଦ୍ଵାରା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରାୟ ୪-୫ ଦିନ ବେଳକୁ ଗଜା ବାହାରି ଆସିଲେ ନଡ଼ାକୁ ପଟାଳି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ । ୫ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ତଳି ୬-୭ ପତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ।

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ: ଜମିକୁ ୩/୪ ଓଡ଼ ଚାଷ କରି ସମତୁଲ କରି ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ସମୟରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୪୫ ସେ.ମି. ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ଦୂରତା ୪୫ ସେ.ମି. ରଖନ୍ତୁ ।

ଖତ ଓ ସାର : ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ୮-୧୦ ଶଗଡ଼ ଗାଈ ଭଲ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଚାରା ରୋପଣ ସମୟରେ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ୍ ଏବଂ ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ସାର ଦିଅନ୍ତୁ । ପରେ ଆଉ ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପତ୍ର ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଶାର୍ଣ୍ଣସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଜଳସେଚନ: ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ପରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ମାଟିର ବତର ଦେଖି ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ: ଲେଟୁୟସ୍ ଫସଲରେ ଘାସ ବାଛି କୋଡ଼ାଖୋସା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଚାରା ରୋପଣ କରିବାର ୨୧ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମେ କୋଡ଼ାଖୋସା କରନ୍ତୁ ।

ରୋଗ ପୋକ: ସାଧାରଣତଃ ଲେଟୁୟସ୍ ଫସଲରେ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଉ ପୋକ ଲାଗନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମେଟାଷ୍ଟକ୍ କୀଟନାଶକ ଔଷଧକୁ ଏଲର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି ହିସାବରେ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଅମଳ: ଏଲର ପ୍ରତି ୪୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ଲେଟୁୟସ୍ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ ।



2025030496