

ବାନ୍ଧି କରାଉଥିବା ସମୟରେ ରୋଗୀକୁ ବସାଇ କିମ୍ବା ପେଟମାଡ଼ି ଶୁଆଇ ବାନ୍ଧି କରାଇବା ଉଚିତ୍ । ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇଲେ ରୋଗୀର ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ବାନ୍ଧି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇପାରେ । ଚେତା ନଥିବା ରୋଗୀର ବାନ୍ଧି କରାଇବା ଅନୁଚିତ୍ । ପାରଦଙ୍ଗାତାୟ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ପେଟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ରୋଗୀକୁ ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଲାଲ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ପିଆଇ ତା'ପରେ ବାନ୍ଧି କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ନକୋଟିନ୍ ଜାତୀୟ ବିଷ ଖାଇଥିବା ରୋଗୀକୁ କଡ଼ା ଚା' ବା କଫି ପିଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସଂଗେସଂଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ୍ ।

ଚର୍ମବାଟଦେଇ ଶରୀରକୁ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ

ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଉପରେ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚର୍ମ ଉପରେ ସାବୁନ୍ ଲଗାଇ ବାରମ୍ବାର ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ୍ । ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାପଟା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଶରୀରରୁ ବାହାରକରି ଚର୍ମକୁ ସାବୁନ୍ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା ସହିତ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ।



ନିଃଶ୍ୱାସ-ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ

ଏଭଳି ରୋଗୀକୁ ସଂଗେସଂଗେ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା ଭଲ । ରୋଗୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତୁ ଖୋଲି ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ନଲାଗିବା ପାଇଁ ରୋଗୀକୁ କମ୍ପଲ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ



ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ରୋଗୀକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲେ ବ୍ରାଉଣିଲି କୌଣସି ମାଦକଦ୍ରବ ପିଇବାକୁ ଦେବା ଅନୁଚିତ୍ । ରୋଗୀର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସ୍ୱଭାବିକ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ କରାଇବା ଉଚିତ୍ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଗେସଂଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ୍ ।

କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ପଡ଼ିଥିଲେ

ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗୀର ଆଖିକୁ ମେଲା ରଖି ପ୍ରଥମେ ୫-୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା ପାଣି ଆଖିକୁ ଛାଟିଲେ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ବାହାରି ଯାଏ । ଚଳାପାଣିରେ ଆଖିକୁ ଧୋଇବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ । ଏସବୁ କରି ସାରିଲା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ୍ ।



ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ଜନିତ ସନ୍ନିପାତ ରୋଗୀର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା

କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧର ପ୍ରଭାବରେ ରୋଗୀଠାରେ ସନ୍ନିପାତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ରୋଗୀକୁ ତଳେ ଶୁଆଇ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ରୋଗୀର ଗୋଡ଼ ପାଖ ମୁଣ୍ଡପାଖ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ହୃଦ୍‌ପିଣ୍ଡକୁ ରକ୍ତ ସଂଚାଳନ ସୁବିଧାରେ ହୋଇଥାଏ । ରୋଗୀକୁ କମ୍ପଲ ବା ରେଜେକ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ରୋଗୀର ଚେତା ଥିଲେ ତାକୁ କଡ଼ା ଚା' ବା କଫି ଉଷୁମ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଆଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ରୋଗୀ ଯେପରି ଗୋଡ଼, ହାତ ଛଟା ଛଟି ନକରେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ହାଲିଆ ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ । ଏଥି ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ରୋଗୀର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ୍ ।

The infographic provides detailed instructions on pesticide safety. It includes sections for 'Follow the 9 safety steps', 'FIRST AID for PESTICIDE CONTAMINATION' (covering skin, eyes, mouth, and inhalation), and 'Farm Safety' (listing protective clothing like wide-brimmed hats, long-sleeved shirts, nitrile gloves, rubber boots, and aprons). It also emphasizes reading labels and washing PPE after use.

Published by:
KVK, Sundargarh-II, Rourkela, Odisha
www.kvksundargarh2.org
E-Mail:kvk.sundargarh2@ouat.ac.in,
Printed at:
Ankitgraphics, Bhubaneswar



OUAT Publication
No.2026030792



**ବିଷାକ୍ତ ଜୀବନାଶକର
ସଠିକ୍ ଓ ନିରାପଦ ବ୍ୟବହାର**



- ଆଲୋଚ୍ୟ:**
ଶ୍ରୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବରାଳ
ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ
ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁଭା କୁଜୁର୍
- ସଂପାଦନା:**
ଡ. ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପତି
ବରିଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମୁଖ୍ୟ
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହାୟତା:
ଶ୍ରୀ ସୋମଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି

କୃଷିବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼-୨, ରାଉରକେଲା
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ବିଷାକ୍ତ ଜୀବନନାଶକର ସଠିକ୍ ଓ ନିରାପଦ ବ୍ୟବହାର

ଯଦିଓ ଫସଲରେ କୀଟ ଓ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବନନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ଶେଷ ପନ୍ଥାଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତଥାପି ଅନେକ ସମୟରେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ କୃଷକ ଜୀବନନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରେନାହିଁ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ କମ୍ ହୁଏନାହିଁ, ବରଂ ବିଷାକ୍ତତା ହେତୁ ଚାଷୀର ଶରୀରରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ଏଣୁ ରାସାୟନିକ ଜୀବନନାଶକର ସଠିକ୍ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥା ନିରାପଦ ବ୍ୟବହାର, ଜୀବନନାଶକଜନିତ ବିଷକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର । ଯାହାଏଠାରେ ବିସ୍ତୃତଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।

୧. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରପାଇଁ ଓ ଥରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିବା ଠିକ୍ ପରିମାଣର ଔଷଧ କିଣନ୍ତୁ ।
୨. କୌଣସିପତେ କଣା ହୋଇଥିବା ଡବା, ଖୁରୁରା ଓ ସିଲ୍ ନଥିବା ଡବା ବା ବୋତଲ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
୩. ଲେବୁଲ୍ ନଥିବା ଜୀବନନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦୌ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
୪. ସମୟସୀମା ଉଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଜୀବନନାଶକ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
୫. ଘର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
୬. ଜୀବନନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଡବାରେ/ବୋତଲରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
୭. ସବୁବେଳେ ଜୀବନନାଶକ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ।
୮. ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ କେବେହେଲେ ଜୀବନନାଶକ ଡବାକୁ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ପରିବହନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଏକାଠି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
୯. ପ୍ରୟୋଗ ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବନନାଶକ ଗଢିତ ସ୍ଥାନରୁ ନିଅନ୍ତୁ ।
୧୦. ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡବାରେ ଥିବା ସୂଚନାପତ୍ର (ଲେବଲ୍)ଟି ଭଲ ଭାବରେ ପଢନ୍ତୁ ।
୧୧. ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ କୀଟନାଶକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ।
୧୨. ତରଳ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଢାଳିବା ସମୟରେ ଛିଟିକି ନ ଆସିବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
୧୩. ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ ।
୧୪. କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ଉଚିତ । ଛୋଟ ପିଲା ଓ ବୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନନାଶକ ସିଞ୍ଚନରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

୧୫. କେବଳ ଅନୁମୋଦିତ ଓ ପରିବେଶ ସହାୟକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
୧୬. ଜୀବନନାଶକ ସକାଳ କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କୌଣସିପତେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁନାହିଁ ।
୧୭. ଅଧିକ ଖରା କିମ୍ବା ପବନ (ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୨ କିମିରୁ ଅଧିକ) ଓ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଥାଇ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ଜୀବନନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
୧୮. ପବନ ବହିବା ଦିଗକୁ ସିଞ୍ଚନ/ବିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
୧୯. ସ୍ଥୂର୍ଣ୍ଣକଟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଥିଲେ ଜୀବନନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
୨୦. ଜୀବନନାଶକ ମିଶ୍ରଣକୁ ପତ୍ର ଉପରେ ଶୁଖିଲା ଥିବା ସମୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଓ ପତ୍ରରେ କାକର କିମ୍ବା ଓଦା ଥିବା ବେଳେ ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
୨୧. ଜୀବନନାଶକ ଓ ଫିମି ନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ହଲୋକୋନ୍ ନୋଜଲ୍ ତୃଣନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ପ୍ଲୁଟ୍ ପ୍ୟାନ୍ ନୋଜଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
୨୨. କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ସମୟରେ ଆଖିରେ ଚଷମା, ମୁହଁରେ ମୁଖା (Mask), ହାତରେ ଗ୍ଲୋବ୍ସ, ଶରୀରରେ ଆପ୍ରନ୍ (Apron), ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି (Cap) ଓ ଗୋଡ଼ରେ ଜୋଡା ପିନ୍ଧି ଶରୀରକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ।
୨୩. କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି, ସାରୁନ, ଗାମୁଛା ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ।
୨୪. କୀଟନାଶକ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ କୌଣସିପତେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଧୂମ୍ରପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
୨୫. ତୃଣନାଶକ ଔଷଧ ଓ ଜୀବନନାଶକ ଔଷଧ ଏକା ସ୍ତେୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁନାହିଁ । ଯଦି ଦୁଇଟି ସ୍ତେୟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେବେ ତୃଣନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ସ୍ତେୟରକୁ ଭଲଭାବରେ ସଫାକରି ଜୀବନନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରେ ।
୨୬. ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ରର ନୋଜଲକୁ ମୁହଁରେ ଫୁଙ୍କି କେବେହେଲେ ସଫା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
୨୭. ବଳକା ମିଶ୍ରଣକୁ ପୋଖରୀ, ନଦୀ କିମ୍ବା ଜଳସେଚନ କେନାଲରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଲି ଜୀବନନାଶକ ଡବା / ଶିଶିକୁ ଚେପାକରି ଚାଷ ଅନୁପଯୋଗୀ ଜମିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ।
୨୮. ବିଷ ପ୍ରୟୋଗର ଠିକ୍ ପରେପରେ ଜମିରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚରିବାକୁ ଛାଡନ୍ତୁନାହିଁ ।
୨୯. ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗର ଅନ୍ତତଃ ସାତ ଦିନ ପରେ ପନିପରିବା ତୋଳନ୍ତୁ ।
୩୦. କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପୋଷାକକୁ ଭଲଭାବରେ ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ସାରୁନ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ।

୩୧. ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଓ ଆଖି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ପାଣିରେ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
୩୨. ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିଃଶ୍ୱାସ-ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ତେବେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ନିଃଶ୍ୱାସ-ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
୩୩. ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପାଖରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ।

ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧଜନିତ ରୋଗୀର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା

ବିଷାକ୍ତ କୀଟନାଶକ ଆଦି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କଲେ ଏହା ଖାଦ୍ୟ, ଚର୍ମ, ନିଃଶ୍ୱାସ-ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନାନାବିଧ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଜୀବନହାନୀର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧର ପ୍ରଭାବରେ ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ହେବା, ବାନ୍ତି ହେବା, କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା, ମୁଣ୍ଡବୁଲାଇବା, ଦେହ ଝିମ୍ଝିମ୍ଝି କରିବା କିମ୍ବା ଥରିବା, ଝାଳ ବୋହିବା, ନିଃଶ୍ୱାସ-ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଚଳ ହୋଇଯିବା ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତା ବୁଡ଼ିଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଏଣୁ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ରୋଗୀର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ନକଲେ ରୋଗୀର ଜୀବନହାନୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଏଣୁ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧଜନିତ ରୋଗୀର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେକ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ପେଟ ଭିତରକୁ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା

ରୋଗୀକୁ ସଂଗେସଂଗେ ବାନ୍ତି କରାଇ ପେଟଭିତରୁ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ବାହାର କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ୨ ଚାମଚ ଲୁଣ ବା ସୋରିଷ ଗୁଣ୍ଡକୁ ୧ ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ରୋଗୀକୁ ପିଆଇଲେ ବାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ । ରୋଗୀର ତୃଷ୍ଣାପାଖରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରାଇ ସଲସଲ କରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ ।

